

Očkování: kojenci

očkování dle vyhlášky zvýrazněno tučně, další jsou nadstandardní

pneumokoky - Prevenar 13 nebo Synflorix

meningokok B - Bexsero

8. týden věku	1. Rotarix, 1. Bexsero
12. týden věku	2. Rotarix + 1. Hexacima , 2. Bexsero
14. týden věku	1. Prevenar 13
16. týden věku	3. Bexsero
20. týden věku	2. Hexacima
22. týden věku	2. Prevenar 13
v roce věku	3. Hexacima
za 14 dnů	3. Prevenar 13
za 14. dnů	4. Bexsero

Po injekcích do svalu – může být první dva dny horečka a bolest (Paralen, Nurofen v čípku)

Očkování se zahajuje proto tak brzy, protože do 3 měsíce věku má miminko obranné látky, které jsou od maminky a přešly na konci těhotenství přes placentu. Jejich hladina ale na konci 3 měsíce věku klesá a proto musí přijít stimul (očkování), aby si miminko začalo vytvářet protilátky, aby v případě, že se s infekcí setká, bylo již chráněno.

V západních zemích se očkuje daleko více, rotaviry jsou v podstatě součástí povinného kalendáře, pneumokoky také, navíc se očkují i meningitidy a tbc.